

CETAP®

Laboratorio
FUNDACION

SENASA Cert. N° 22-007
Estab. Elab. N° 7112
D.T.M.V G.Ladaga MP5113

CETAP® es un gel sellador del canal del pezón, facilitador fisiológico de la formación del tapón de queratina.

INDICACIONES

CETAP® está indicado en la prevención de nuevas infecciones intramamarias a lo largo del período de secado.

El canal estriado se cierra y queda sellado por un tapón de queratina. Esto no solo forma una barrera física contra la entrada de patógenos, sino que los ácidos grasos esterificados y no esterificados entre otros activos, presentes en la queratina inhiben el crecimiento bacteriano.

Como la susceptibilidad a nuevas infecciones intramamarias es alta durante las primeras 3 semanas del período seco la rápida formación de este tapón fisiológico es esencial y no debe ser reemplazado por ningún otro proceso mecánico durante el resto del periodo.

Por ello **CETAP®** crea las siguiente condiciones:

1. Es una matriz de refuerzo polimérico que facilita la formación fisiológica del tapón de queratina dentro del periodo normal, sellando el canal hasta la siguiente lactancia.
2. Otorga una rápida recuperación del epitelio, creando el medio propicio más capacitado para enfrentar un ataque bacteriano.
3. Evita la presión intramamaria en el parto, mejorando el flujo natural del calostro en el primer ordeño post parto.
4. No se pierde calostro, esencial en la inmunidad del ternero.
5. No requiere precauciones especiales en la máquina de ordeño en el primer ordeño post parto.

COMPOSICIÓN

Hialuronato de sodio	3 g
Poli-(D) glucosamina	4 g
Gel hidrodispersable c.s.p.....	100 ml

ADMINISTRACIÓN

Vía intramamaria. Por favor lea atentamente y siga los



siguientes pasos:

1. Luego del último ordeño, repasar la higiene del pezón con una toallita descartable o referentemente algodón embebido en alcohol.
2. Según criterio del veterinario, colocar el producto con antibiótico para secado. Si se desea masajear el pezón para difundir el producto hacia la glándula, hacerlo en ese momento.
3. A continuación, aplicar un inyector de **CETAP®** sin masajear el pezón.
4. Repetir la operación en cada uno de los cuatro pezones (cuartos mamarios).

ADVERTENCIA

Período de retiro: La restricción de leche o carne para envío a mercado es de 0 días. Producto no tóxico por ingestión.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 24 inyectores con anillos de flexión.



WWW.LABORATORIOFUNDACION.COM



(+54) 11 5940-3012

(+54) 11 4633-2794



info@labfundacion.com.ar